



PromoSan-CRSP București

Comunicat de pres Campanie de prevenire a bolilor cardiovasculare, 2019

Campania locală de prevenire a bolilor cardiovasculare (BCV) se derulează sub sloganul: *“O inimă mai sănătoasă prin reducerea factorilor de risc”*.

În 2015 trăiau cu BCV în UE 49 milioane persoane, în creștere față de 1990 ca valori absolute; totuși, prevalența BCV standardizată (corectată în raport cu structura vârstelor pentru a facilita comparația inter-țări) a prezentat o anumită descendență. Intra-UE existau în 2015 variații mari ale mortalității standardizate prin BCV, de exemplu valori de circa 8 ori mai ridicate în Bulgaria față de cele din Franța. Din punct de vedere geografic, România urmează imediat după Bulgaria pe scara gravității.

În UE, dintre factorii comportamentali de risc, alimentația nesănătoasă contribuie cel mai mult la mortalitatea prin BCV, în timp ce tensiunea arterială sistolică ridicată primează între factorii biologici de risc.

În 2016 față de 2014-2015, în România s-a înregistrat o scădere moderată a procentului de cazuri noi BCV din totalul pacienților BCV în evidențele medicilor de familie iar numărul pacienților externați cu BCV a scăzut moderat.

În profil teritorial, valorile cele mai mari ale prevalenței bolilor ischemice cardiace în 2015 se înregistrează în județele: Brașov, Sibiu, Caraș-Severin, iar cele mai mici în județele: Ilfov, Olt, Satu Mare; ierarhia prevalenței bolilor cerebrovasculare era Caraș-Severin, Arad și Vâlcea – valori mari, Baia Mare, Ilfov, Olt, București – valori mici.

Pe plan local:

- Incidența bolnavilor cu cardiopatie ischemică, aflați în evidența medicului de familie, a fost mai mare în anul 2017 (737,07‰000 loc.) față de anii 2016 (407,54‰000 loc.) și 2015 (408,85‰000 loc.). Prevalența, la cabinetul medicului de familie, a bolnavilor cu această afecțiune a fost mai mare în anul 2017 (4993,83‰000 loc.) comparativ cu 2016 (4696,23‰000 loc.) și 2015 (4514,43‰000 loc.).

- Bolnavii cu Infarct Acut de Miocard, ieșiți din spital, în 2017 (181,16‰000 loc.) au fost semnificativ mai mulți față de bolnavii cu același diagnostic în 2016 (151,01‰000 loc.) și 2015 (147,25‰000 loc.).

- La cabinetul medicului de familie, cei mai mulți bolnavi cu HTA au fost dispensarizați în anul 2017 (9972,44‰000 loc.), comparativ cu anii 2015 (8833,60‰000 loc.) și 2016 (9486,68‰000 loc.).

Continuarea efortului educativ pentru combaterea factorilor de risc specifici BCV este obligatorie pentru consolidarea tendințelor pozitive ale morbi-mortalității în anii care vor urma.

Persoană de contact: Dr. Silberberg Kalliope, compartiment Evaluare și Promovarea Sănătății, DSP Timiș, telefon: 0256-272750

Pentru succesul acestei campanii, contăm pe sprijinul dumneavoastră activ - veniți cu noi!