



CAMPANIA

„Sănătatea mintală - parte integrantă și esențială a sănătății”

IANUARIE 2023

LA NIVEL GLOBAL

1 din 8 persoane suferă de o tulburare mintală, femeile fiind afectate într-un procent mai mare decât bărbații.¹




1 din 10 femei suferă de depresie postnatală în primul an după naștere.

1 din 1000 de femei dezvoltă o afecțiune mai gravă numită **psihoză postpartum**.²




Comparând datele din România și Europa Centrală se observă că nr. total de cazuri de anxietate a fost în creștere în perioada 2010-2019, pornind de la o rată a prevalenței mult mai mică comparativ Europa Centrală și atingând aproape același nivel în anul 2019.

Prevalența anxietății % comparativ România-Europa Centrală, în perioada 2010-2019³




În perioada 2010-2019, prevalența depresiei în România, pe genuri înregistrează un platou aproximativ, la femei aproape dublu față de bărbați.

Prevalența depresiei (%) în România, pe genuri, în perioada 2010-2019³



Prevalența tulburărilor mintale și de comportament în România a crescut constant în ultimii 10 ani, astfel de la valoarea de 1566,3⁰/₀₀₀₀ de locuitori în anul 2012 a ajuns la o valoare aproape dublă de 2889,9⁰/₀₀₀₀ de locuitori, în anul 2021.

Prevalența (rate la ⁰/₀₀₀₀ de locuitori) tulburărilor mintale și de comportament (cod ICD 10 F00-F99), în România, în perioada 2012-2021⁴



¹World Mental Health for All. Transforming mental health for all
<https://www.wemhd.com/depression/guide/postpartum-depression/051e9c5e80088a61-1-1>
<https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>
²INSP-CNSBP



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



CENTRUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE
A BOLILOR NETRANSMISIBILE



CENTRUL REGIONAL DE
SĂNĂTATE PUBLICĂ TÂRGU MUREȘ